

اختبار الثلاثي الأول في مادة علوم الطبيعة و الحياة**التمرين الأول: (11 نقطة)**

تؤمن المبلغات العصبية انتقال الرسالة العصبية على مستوى المشبك ولتحديد آلية انتقالها، نقترح عليك الدراسة التالية:

الجزء الأول :

يمثل النقل المشبكي أحد آليات نقل المعلومة و للتعرف على هذه الآلية تم إنجاز تجربة على مستوى اتصال عصبي عضلي. التركيب التجريبي و النتائج (قيم فرق الكمون الغشائي المسجلة على الجهازين O₁O₂) ممثلة في الشكل (أ) من الوثيقة (1).

النتائج	المراحل التجريبية	الشكل (ب)
	1- / تنبيه فعال في (S)	
	2- / إضافة قطرة من الأستيل كولين في (F)	
	3- / قطرة من الأستيل كولين داخل العنصر (Y2)	
	4- / ماء البحر خال من الكالسيوم Ca ²⁺ و التنبيه في (S)	
	الشكل (أ)	


الوثيقة (1)

1- أ- ما هي المعلومات التي تقدمها كل مرحلة تجريبية مع التعليل.

ب- مكنت الملاحظة بالمجهر الإلكتروني لمنطقة المشبك من الحصول على حالتها الشكل (ب) من الوثيقة (1).

- أوجد العلاقة بين حالتها الشكل (ب) و تسجيلات الشكل (أ). علل.

2- في تجربة أخرى تم حقن مادة البيلوكاربين pilocarpine على مستوى المنطقة (F) والتي تعمل على تثبيط التفاعل الآتي:



- اعتمادا على النتائج التجريبية للمرحلة (1) وضح مع الرسم التسجيل الذي يمكن الحصول عليه في الجهاز (O₂).


الجزء الثاني :

التنوع الوظيفي للمشابك يحقق الحفاظ على توازن وضعية الجسم، لفهم تأثير المشابك في نقل الرسالة العصبية، نحقق التجربة الموضحة في الوثيقة (2).

القيم بالميلي فولط				موقع التنبيه الفعال	المرحلة التجريبية	
1ق	2ق	3ق	4ق			
-85			-70	في N1	1	
	+35		+35	في N2	2	
	-60		-70	في N3	3	
-85	+35		-70	تنبهين في N2 و N1 في نفس الوقت	4	
-85	+35	-60	+35	في N3 و N2 و N1 في نفس الوقت	5	

الوثيقة (2)

- 1- حدد أنواع المشابك : N_1M ، N_2M ، N_3M . علل إجابتك.
- 2- فسر نتائج المرحلتين التجريبتين 4 و 5 . ماذا تستنتج؟
- 3- بين كيف يضمن تنوع المشابك توازن وضعية الجسم.



التمرين الثاني: (9 نقاط)

الجزء الأول: تمثل الوثيقة (1) رسم تخطيطي لمبيض أنثى.

- 1- هل المبيض مستأصل من أنثى بالغة أم لا ؟ علل إجابتك.
- 2- سم الدورة الجنسية لهذا العضو و كذا البيانات المرقمة .

الجزء الثاني: لغرض معرفة العوامل المتحكمة في الدورة الجنسية عند المرأة ، أنجزت عدة تجارب على إناث بالغة من القردة. نتائجها مبينة في الجدول التالي:


التجربة	المرحلة	الضروف التجريبية	النتائج
الأولى	1	حيوان عادي	استمرار الدورة الجنسية (المبيضية و الرحمية)
	2	استئصال الرحم	استمرار الدورة المبيضية
	3	استئصال المبيض	اختفاء الدورة الرحمية
	4	قطع الأعصاب المرتبطة بالرحم	استمرار الدورة الرحمية
الثانية	1	حقن الحيوان بالأسستروجين	ازدياد سمك مخاطية الرحم
	2	حقن الحيوان بالبروجسترون	لا يتغير سمك مخاطية الرحم
	3	حقن الحيوان بالأسستروجين ثم بالبروجسترون	ازدياد سمك مخاطية الرحم خلال الحقن الأول ويتواصل خلال الحقن الثاني
الثالثة	1	استئصال الغدة النخامية	اختفاء الدورة الجنسية
	2	حقن مستخلصات الفص الأمامي للغدة النخامية	استرجاع الدورة الجنسية
	3	قطع الأوعية الدموية الواصلة بيت تحت السريير البصري و الغدة النخامية	اختفاء الدورة الجنسية

1- ما هي المعلومات المستخلصة من نتائج التجربة الأولى ؟ اقترح تجربة تدعم بها إجابتك .

2- ماذا تستخلص من نتائج التجربة الثانية ؟

3- معتمدا على معلوماتك قدم تفسيراً لنتائج التجربة الثالثة.

الجزء الثالث: بالإستعانة بالمعلومات السابقة و مكتسباتك أنجز مخطط يوضح العلاقة الوظيفية بين الأعضاء المدروسة.

		الجزء الأول
3	4×0.75	<p>(1)-</p> <p>(أ)- المعلومات المستخرجة مع التعليل :</p> <p>المرحلة 1 : يضمن المشبك انتقال الرسالة العصبية من العنصر قبل مشبكي إلى العنصر بعد المشبكي .</p> <p>التعليل : عند التنبيه في S سجل فرق كمن في العنصر قبل المشبكي ثم في العنصر بعد المشبكي وهذا ما يؤكد مرور الرسالة عبر المشبك .</p> <p>المرحلة 2 : تنتقل الرسالة العصبية على مستوى المشبك بواسطة الأستيل كولين الذي يؤثر في الغشاء بعد المشبكي فقط .</p> <p>التعليل : عند حقن الأستيل كولين في (F) سجل فرق كمن في الليف بعد المشبكي فقط .</p> <p>المرحلة 3 : يؤثر الأستيل كولين على سطح الغشاء بعد المشبكي ولا يؤثر داخل الخلية بعد المشبكية</p> <p>التعليل : عند حقن الأستيل كولين داخل الليف لم يسجل فرق كمن .</p> <p>المرحلة 4 : انتقال الرسالة العصبية على مستوى المشبك بشرط توفر Ca^{2+} .</p> <p>التعليل : عند تنبيه العنصر قبل المشبكي انتقلت فيه الرسالة العصبية لكنها لم تنتقل إلى العنصر بعد المشبكي لغياب Ca^{2+}</p>
2	<p>الحالة : 2×0.25</p> <p>التعليل : 3×0.5</p>	<p>(ب)- إيجاد العلاقة بين حائتي الشكل (ب) و تسجيلات (أ) :</p> <p>- الحالة (1) توافق المرحلة 1</p> <p>التعليل : تناقص عدد الحويصلات المشبكية لتحرير المبلغ الكيميائي (الأستيل كولين) ، الذي يعمل على انتقال الرسالة العصبية إلى الخلية بعد المشبكية حيث تم تسجيل فرق كمن</p> <p>الحالة 2 : توافق المراحل 2 ، 3 ، 4 .</p> <p>التعليل :</p> <p>بالنسبة للمرحلتين 2 ، 3 : كثرة الحويصلات المشبكية ، لعدم تحريرها للمبلغ الكيميائي بسبب غياب التنبيه في الخلية قبل المشبكية .</p> <p>بالنسبة للمرحلة 4 : كثرة الحويصلات المشبكية ، لعدم تحريرها للمبلغ الكيميائي بسبب غياب Ca^{2+} .</p>
1	0.5	<p>(2) - تمثيل التسجيل مع التوضيح :</p> <p>- التسجيل :</p>  <p>- التوضيح : يعود استمرار التسجيل إلى عدم إساءة الأستيل كولين مما يبقيه قادرا على استمرار توليد كمونات بعد مشبكية نتيجة الفتح القنوات و تدفق داخلي لـ Na^+ .</p>
2.25	3×0.75	<p>الجزء الثاني</p> <p>(1) - تحديد أنواع المشابك مع التعليل :</p> <p>المشبك N1M : تنبيطي . التعليل : لأن فرق الكمون المسجل (-85) هو فرط استقطاب المشبك N2M : تنبئيه . التعليل : لأن فرق الكمون المسجل (+35) يمثل كمن عمل و انتشاره في M .</p> <p>المشبك N3M : تنبئيه التعليل : لتسجيل كمن تنبئيه (-60 ميلي فولط) في ق3 .</p> <p>2- تفسير نتائج المرحلتين 4 ، 5</p> <p>المرحلة 4 : يفسر تسجيل كمن راحة في ق4 لأن محصلة دمج الكمونين التنبيطي (-85)</p>
.2	2×0.5	<p>و التنبئيه (+35) أقل من عتبة زوال استقطاب العصبون M .</p> <p>المرحلة 5 : يفسر تسجيل كمن عمل في ق4 لأن محصلة دمج الكمونيات الثلاث (-85 ، +35 ، -60) أكبر أو تساوي عتبة زوال استقطاب العصبون M .</p> <p>الاستنتاج :</p> <p>يعمل العصبون M على دمج الرسائل العصبية الواردة إليه و تكون استجابته حسب محصلة الدمج (دون العتبة لا تتولد الرسالة ، أكبر من العتبة أو تساويها تتولد الرسالة) .</p>
0.75	0.75	<p>(3)- بيان تنوع المشابك في المحافظة على وضعية الجسم :</p> <p>تنوع المشابك يضمن العمل المتضاد والمنسق لعمل العضلات المتعاكسة (القابضة و الباسطة) فيحافظ الجسم على وضعيته .</p>

العلامة		عناصر الإجابة
مجموع	مجزأة	
0.5	0.25	الجزء الأول 1- المبيض مستأصل من أنثى بالغة .. التعليل : لأن المبيض في حالة نشاط نلاحظ تطور الجريبات و تحرر البويضة . 2- البيانات :
2.5	2.25	1- أوعية دموية 2- جريب أولي 3- جريب ابتدائي 4- جريب ثانوي 5- جريب جوفي 6- جريب ناضج 7- بويضة 8- جسم أصفر متطور 9 - جسم أصفر ضامر 3- تسمى الدورة الجنسية لهذا العضو بالدورة المبيضية
0.5	0.5	الجزء الثاني: 1- المعلومات المستخلصة من التجربة (1) : المبيض يؤثر على نشاط الرحم ويتم ذلك عن طريق هرمونات الرحم لا يؤثر على المبيض.
0.5	0.5	2- التجربة المدعمة : حقن حيوان التجربة 1 في المرحلة 3 بمستخلصات المبيض فيؤدي على ازدياد سمك المخاطية و حدوث دورة رحمية.
0.5	0.5	3- المعلومة المستخلصة : الإستروجين يؤدي إلى ازدياد سمك بطانة الرحم بينما البروجيستيرون لا يؤثر 4- تفسير التجربة 3 :
		* المرحلتين 1 و 2 : الغدة النخامية تتحكم في الدورة الجنسية عن طريق إفراز الفص الأمامي لهرمونين هما
0.25	0.25	FSH : ينشط تطور الجريب و يتحكم في إفراز هرموناته (الاستروجينات)
0.25	0.25	LH : ينشط حدوث الإباضة و يحفز تحول ما تبقى من الجريب المتمزق إلى جسم أصفر مفرزا
1.5	0.25	الاستروجين والبروجيستيرون وبالتالي غياب الهرمونات النخامية لا يسمح بحدوث الدورة المبيضية
0.25	0.25	غياب الدورة المبيضية يعني غياب الهرمونات المبيضية المسؤولة عن تطور مخاطية الرحم إذن
0.25	0.25	لا تحدث الدورة الرحمية
0.25	0.25	* المرحلة 3 : منطقة تحت السرير البصري تتحكم في الدورة الجنسية و ذلك عن طريق إفرازها لهرمون GnRH الذي يحفز الفص الأمامي للغدة النخامية على إفراز LH و FSH
		الجزء الثالث: المخطط

