

التمرين الأول: (06 نقاط)

(1) أحسب الدالة المشتقة لكل دالة من الدوال التالية :

$$\checkmark f(x) = x^3 - x^2 + 4x + \sqrt{3}$$

$$\checkmark g(x) = \frac{5}{3}x^3 + x^2 - 9$$

$$\checkmark h(x) = \frac{2x+3}{-x+2}$$

(2) لتكن الدالة المعرفة على \mathbb{R} بـ : $f(x) = x^2 + 3x$ -
أحسب $f(3)$ ، $f(3+h)$ ، ثم عين العدد المشتق $f'(3) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3+h) - f(3)}{h}$

التمرين الثاني: (09 نقاط)

f دالة معرفة على \mathbb{R} كمايلي : $f(x) = -2x^2 + 8x - 5$

1. عين الدالة المشتقة f' للدالة f .
2. أدرس إشارة $f'(x)$ واستنتج اتجاه تغير الدالة f .
3. شكل جدول تغيرات الدالة f .
4. أكتب معادلة المماس (T) لمنحني الدالة f عند النقطة ذات الفاصلة $a = 3$.
5. جد القيم الحدية للدالة f .
6. مثل (C_f) منحني الدالة f ، والمستقيم (T) في معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

التمرين الثالث: (05 نقاط)


في الشكل المقابل ، (C_f) هو التمثيل البياني في مستو

معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ للدالة f المعرفة على \mathbb{R}

بالعبارة التالية : $f(x) = -x^2 + 2x + 3$:

بالاعتماد على البيان :

1. شكل جدول التغيرات الدالة f على \mathbb{R} .
2. حل بيانيا : $f(x) = 0$ ، $f(x) < 0$ ، $f(x) > 0$



بالتوفيق للجميع