

التمرين الأول: (06,5 ن)

المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$. دائرة مركزها O و طول نصف قطرها $\frac{8}{2^n}$ حيث n عدد طبيعي. M_n نقطة من الدائرة (\mathcal{C}_n) حيث : $(\vec{i}; \overrightarrow{OM_n}) = \frac{n\pi}{2}$

1. أنشئ النقط $M_0 ; M_1 ; M_2 ; M_3 ; M_4$.
2. عيّن طبيعة المثلث OM_nM_{n+1} .
3. بين أن : $M_nM_{n+1} = \frac{8\sqrt{5}}{2^{n+1}}$
4. من أجل كل عدد طبيعي n نضع : $u_n = M_nM_{n+1}$
 (أ) برهن أن (u_n) متتالية هندسية . عيّن أساسها و حدّها الأول. هل هي متقاربة ؟
 (ب) احسب بدلالة n المجموع S_n حيث : $S_n = M_0M_1 + M_1M_2 + \dots + M_nM_{n+1}$
 (ج) احسب بدلالة n الجداء P_n حيث : $P_n = u_0^2 \times u_1^2 \times \dots \times u_n^2$

التمرين الثاني: (06,5 ن)

• القول إن الدالة f دورية و دورها p يعني: أنه من أجل كل x من D_f $x+p \in D_f$ و $f(x+p) = f(x)$.

نعتبر الدالة f المعرفة على \mathbb{R} بالعلاقة : $f(x) = 1 - 8\cos x - 4\cos 2x$

1. (أ) برهن أن f دورية و دورها 2π .

(ب) ادرس شفعية f .

(ج) استنتج أنه يمكن اقتصار دراسة f على المجال $[0; \pi]$ و اشرح كيف يمكن أن نكمل التمثيل البياني للدالة f على $[0; \pi]$ لكي نحصل على التمثيل البياني للدالة f على \mathbb{R} .

2. (أ) احسب $f'(x)$ و تحقق أن $f'(x) = 8\sin x(1 + 2\cos x)$.

(ب) ادرس إشارة $f'(x)$ ثم شكّل جدول تغيرات f من أجل x ينتمي إلى المجال $[0; \pi]$.

3. (أ) تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x ، $f(x) = -8\cos^2 x - 8\cos x + 5$.

(ب) استنتج حسابيا حلول المعادلة $f(x) = -1$ في \mathbb{R} .

ABC مثلث متقايس الساقين رأسه A حيث $(\overline{BC}; \overline{BA}) = \frac{2\pi}{5}$ و k عدد صحيح نسبي ، نضع $BC = a$.

منصف الزاوية \widehat{ABC} يقطع الضلع $[AC]$ في نقطة D .

$[DH]$ ؛ $[DI]$ ؛ $[AJ]$ و $[BK]$ هي الارتفاعات في المثلثات DAB ؛ DBC ؛ ABC و DBC على الترتيب.

1. أنجز شكلاً .

2. أ) برهن أن المثلثان DAB و DBC متقايسا الساقين .

ب) نعتبر المثلث DAB ، عبّر عن الطول AB بدلالة $\cos \frac{\pi}{5}$ و a .

استنتج عبارة CD بدلالة $\cos \frac{\pi}{5}$ و a .

ج) نعتبر المثلث DBC ، برهن أن: $CD = 2a \cos \frac{2\pi}{5}$

د) استنتج أن: $\cos \frac{\pi}{5} - \cos \frac{2\pi}{5} = \frac{1}{2}$

3. أ) نعتبر المثلث DBC ، عبّر عن الطول IB بدلالة $\cos \frac{\pi}{5}$ و a .

استنتج عبارة IC بدلالة $\cos \frac{\pi}{5}$ و a .

ب) برهن أن: $IC = 2a \left(\cos^2 \frac{2\pi}{5} \right)$

ج) استنتج أن: $\cos \frac{\pi}{5} + 2 \cos^2 \frac{2\pi}{5} = 1$

4. أ) حل في \mathbb{R} المعادلة: $x^2 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{4} = 0$

ب) تحقق أن $\cos \frac{2\pi}{5}$ حل لهذه المعادلة

ج) استنتج القيمة المضبوطة للعدد $\cos \frac{2\pi}{5}$ ، ثم للعدد $\cos \frac{\pi}{5}$.

0,80

Bonus

أثبت أنه من أجل كل عدد حقيقي x يكون: $\cos(\sin x) > \sin(\cos x)$