

## \* اختبار الفصل الأول في مادة الرياضيات \*

التمرين الأول: ( نقاط )

إختر الإجابة الصحيحة مع التبرير:

① المعادلة  $e^{2x} - 3e^x - 4 = 0$  تقبل في  $IR$ :

أ // حلا واحدا      ب // حل متمايزين      ج // لا تقبل حلول

② المعادلة التفاضلية  $y = 2y' - 1$  تقبل كمجموعة حلول:

أ //  $x \mapsto ke^{2x}$       ب //  $x \mapsto ke^{2x} + \frac{1}{2}$       ج //  $x \mapsto ke^{\frac{1}{2}x}$       د //  $x \mapsto ke^{\frac{1}{2}x} - 1$

③ الدالة المشتقة للدالة  $f$  المعرفة على  $IR$  كما يلي  $f(x) = 2020^x$  هي:

أ //  $f(x) = 2019^x$       ب //  $f(x) = 2020^{x-1}$       ج //  $f(x) = e^{2020} \cdot 2020^x$       د //  $f(x) = \ln(2020) \cdot 2020^x$

④ حلول المعادلة  $\log|x| = 2020$  في  $IR$  هي:

أ //  $S = \{e^{2020}\}$       ب //  $S = \{10^{2020}\}$       ج //  $S = \{10^{2020}; 10^{-2020}\}$       د //  $S = \{10^{2020}; -10^{2020}\}$

التمرين الثاني: ( نقاط )الجزء I: نعتبر الدالة  $g$  المعرفة على  $IR$  بما يلي:  $g(x) = \alpha x + \frac{\beta}{1+e^x}$  حيث  $\alpha$  و  $\beta$  عدنان حقيقيان ثابتان.

أحسب  $g'(x)$  ثم عين العددين  $\alpha$  و  $\beta$  حيث  $g(1) = \frac{e}{1+e}$  و  $g'(0) = \frac{5}{4}$ .

الجزء II: لتكن الدالة  $f$  المعرفة على  $IR$  بما يلي:  $f(x) = x - \frac{1}{1+e^x}$  و  $(C_f)$  تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس  $(O; \vec{i}; \vec{j})$ . (وحدة الطول 4 cm)

① احسب  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  و  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ .

② بين أنه من أجل كل عدد حقيقي  $x$ ،  $f'(x) > 0$  ثم شكل جدول تغيرات الدالة  $f$ .③ أ // بين أن المستقيمين المعرفين بـ:  $(\Delta_1): y = x$  و  $(\Delta_2): y = x - 1$  مستقيمان مقاربان للمنحنى  $(C_f)$ .ب // ادرس الوضع النسبي للمنحنى  $(C_f)$  و المستقيمان  $(\Delta_1)$  و  $(\Delta_2)$ .④ تحقق أن:  $f(-x) + f(x) = -1$ ، ماذا تستنتج؟⑤ ليكن  $(T)$  المماس للمنحنى  $(C_f)$  عند النقطة ذات الفاصلة 0. اكتب معادلة لـ  $(T)$ .⑥ أ // بين أن المعادلة  $f(x) = 0$  تقبل حلا حقيقيا وحيدا  $\alpha$  حيث  $0 < \alpha < 0.5$ .

ب // تحقق أن:  $1 + e^\alpha = \frac{1}{\alpha}$ .

⑦ بين أن  $(C_f)$  يقبل نقطة إنعطاف  $A$  يطلب تعيين إحداثياتها.⑧ انشئ كل من  $(\Delta_1)$  ;  $(\Delta_2)$  ;  $(T)$  و  $(C_f)$ .⑨ ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي  $m$  عدد و إشارة حلول المعادلة  $me^x + m - 1 = 0$ .

## التمرين الثالث: ( نقاط )

الجزء I: لتكن الدالة العددية  $g$  المعرفة على المجال  $]-\infty; 1[$  حيث:  $g(x) = -x^2 + 2x + 4\ln(1-x)$

و  $(C_g)$  تمثيلها البياني في معلم متعامد و متجانس  $(O; \vec{i}; \vec{j})$ .

(كما في الشكل المقابل)

- 1 بقراءة بيانية للمنحنى  $(C_g)$  عين عدد حلول المعادلة  $g(x) = 0$ .
- 2 احسب  $g(0)$  ثم بين أن المعادلة  $g(x) = 0$  تقبل حلا وحيدا  $\alpha$  حيث:  $-0.88 < \alpha < -0.87$ .
- 3 استنتج حسب قيم  $x$  إشارة  $g(x)$  على المجال  $]-\infty; 1[$ .

الجزء II: لتكن الدالة  $f$  المعرفة على المجال  $]-\infty; 1[$

حيث:  $f(x) = -(x+1) + \frac{4}{1-x} \ln(1-x) + \frac{5}{1-x}$

و  $(C_f)$  تمثيلها البياني في معلم متعامد و متجانس  $(O; \vec{i}; \vec{j})$ .

- 1 احسب  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$  ثم فسر النتيجة بيانيا، ثم احسب  $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ .
- 2 أ// بين أن المستقيم  $(\Delta)$  ذو المعادلة  $y = -x - 1$  مقارب مائيل لـ  $(C_f)$ .
- ب// ادرس وضعية المنحنى  $(C_f)$  بالنسبة للمستقيم  $(\Delta)$ .

3 أ// بين أنه من أجل كل  $x$  من  $]-\infty; 1[$  لدينا:  $f'(x) = \frac{g(x)}{(1-x)^2}$ .

ب// استنتج اتجاه تغير الدالة  $f$  و شكل جدول تغيراتها.

4 بين أنه يوجد مماس للمنحنى  $(C_f)$  موازي للمستقيم  $(\Delta)$  لا يطلب تعيين معادلته.

5 ارسم المستقيمين  $(\Delta)$  و  $(C_f)$ . (نأخذ:  $f(\alpha) = 3.9$ ).

الجزء III: نعتبر الدالة  $k$  المعرفة على المجال  $]1; +\infty[$  بـ:  $k(x) = f(2-x)$  و  $(C_k)$  ليكن تمثيلها البياني.

أشرح كيف يمكن رسم  $(C_k)$  إنطلاقا من  $(C_f)$  ثم أرسمه في نفس المعلم السابق.

## بالتوفيق

### هذا العمل مشترك بين ثانويات

- ❖ أفلاح بن عبد الوهاب - تيارت -
- ❖ بن سنوسي إبراهيم - الرحوية -
- ❖ مشري ميسوم - الرحوية -