



على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:  
الموضوع الأول

التمرين الأول: (04 نقاط)

لتكن  $(u_n)$  المتتالية المعرّفة بدّها الأول  $u_0 = -2$  حيث  $u_0 = -2$  ومن أجل كل عدد طبيعي  $n$  ،  $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 1$  .

(1) أ) بيّن أنّ: من أجل كل عدد طبيعي  $n$  ،  $u_n < 2$  .

ب) عيّن اتجاه تغيّر المتتالية  $(u_n)$  ثمّ استنتج أنّها متقاربة.

(2) لتكن المتتالية  $(v_n)$  المعرّفة كما يلي : من أجل كل عدد طبيعي  $n$  ،  $v_n = 2u_n - 4$  .

أ) أثبت أنّ المتتالية  $(v_n)$  هندسية يطلب تعيين أساسها  $q$  وحدّها الأول  $v_0$  .

ب) جد عبارة  $v_n$  بدلالة  $n$  ثمّ استنتج عبارة  $u_n$  بدلالة  $n$  .


(3) احسب بدلالة  $n$  المجموع  $S_n$  حيث  $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$  .

التمرين الثاني: (04 نقاط)

الشجرة المقابلة تتمذج تجربة عشوائية حيث  $A$  و  $B$  حادثتان ،  $\bar{A}$  و  $\bar{B}$  حادثتهما العكسيتان على الترتيب .

(1) انقل وأكمل الشجرة المقابلة ثمّ احسب الاحتمالات الآتية :

$$P(A \cap \bar{B}) \text{ و } P(A \cap B)$$



(2) أ) احسب الاحتمالات الآتية:  $P(B)$  ،  $P_B(A)$  و  $P_{\bar{B}}(A)$  .

ب) انقل وأكمل الشجرة المقابلة .



التمرين الثالث: (04 نقاط)

الجدول الآتي يعطي نسبة الأمية في بلد ما، خلال الفترة الممتدة من 1948 إلى 2008 .

السنة	1948	1958	1968	1978	1988	1998	2008
الرتبة $x_i$	1	2	3	4	5	6	7
نسبة الأمية $y_i$	14	92	74,6	60	31	38,4	22

(1 أ) احسب إحداثي النقطة المتوسطة  $G$ . (تدور النتائج إلى  $10^{-2}$ )

(ب) مثل سحابة النقط  $M_i(x_i; y_i)$  في معلم متعامد (على حامل محور الفواصل  $1cm$  يمثل رتبة واحدة وعلى حامل محور الترتيب  $1cm$  يمثل 10%).

(2) بين أن معادلة مستقيم الانحدار بالمربعات الدنيا هي :  $y = -4,53x + 65,54$ .

(3) باستعمال التعديل الخطي السابق ، قدر نسبة الأمية في سنة 2038 في هذا البلد.

(4) ابتداءً من أي سنة تكون نسبة الأمية في هذا البلد أقل من 5%.

التمرين الرابع: (08 نقاط)

(I) لتكن  $g$  الدالة المعرفة على  $\mathbb{R}$  كما يلي :  $g(x) = 2x - 1 - e^{2x}$ .

(1) ادرس اتجاه تغير الدالة  $g$ .

(2) استنتج إشارة  $g(x)$ .

(II) نعتبر الدالة  $f$  المعرفة على  $\mathbb{R}$  كما يلي :  $f(x) = x^2 - x - \frac{1}{2}e^{2x}$ .

( $C_f$ ) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  حيث  $\|\vec{i}\| = 2cm$ .

(1) احسب  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  و  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$  (يعطى:  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{2x}}{x^2} = +\infty$ )

(2) ادرس اتجاه تغير الدالة  $f$  ثم شكّل جدول تغيراتها.

(3 أ) بين أن المعادلة  $f(x) = 0$  تقبل حلاً وحيداً  $\alpha$  حيث  $-0,25 < \alpha < -0,24$ .

(ب) أثبت أن المنحنى ( $C_f$ ) يقبل نقطة انعطاف  $A$  إحداثياتها  $(0; \frac{-1}{2})$ .

(ج) اكتب معادلة المماس ( $T$ ) للمنحنى ( $C_f$ ) في النقطة  $A$ .

(4) ارسم ( $T$ ) و ( $C_f$ ).

(5 أ) احسب بالسنتيمتر مربع المساحة  $A(\alpha)$  للحيز المستوي المحدد بالمنحنى ( $C_f$ ) والمستقيمتين

التي معادلاتها  $x = 0$ ،  $x = \alpha$  و  $y = 0$ .

(ب) تحقق أن  $A(\alpha) = \frac{1}{3}(4\alpha^3 - 12\alpha^2 + 6\alpha + 3)cm^2$ .



## الموضوع الثاني

### التمرين الأول: (04 نقاط)

يمثل الجدول الآتي تطور إنتاج مصنع للإسمنت خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2014 .

السنة	2010	2011	2012	2013	2014
ترتيب السنوات $x_i$	1	2	3	4	5
الإنتاج بالمليون طن $y_i$	4,8	5	5,5	6,2	7

- (1) عيّن إحداثيي النقطة المتوسطة  $G$  ثمّ مثلّ سحابة النقط  $M_i(x_i; y_i)$  في معلم متعامد ( $1cm$  يمثل رتبة واحدة على حامل محور الفواصل ،  $1cm$  يمثل 1 مليون طن على حامل محور الترتيب )
- (2) لتكن  $y = ax + b$  معادلة  $(\Delta)$ ، مستقيم الانحدار بالمربعات الدنيا للسلسلة  $(x_i; y_i)$  .  
بيّن أنّ:  $a = 0,56$  ثمّ احسب  $b$  . ( تعطى النتيجة مدورة إلى  $10^{-2}$  )
- (3) من أهداف المصنع الوصول إلى إنتاج يفوق 8,45 مليون طن في سنة 2017 .  
هل يمكن تحقيق هذا الهدف باستعمال التعديل الخطي السابق ؟ مع التبرير .
- (4) ابتداءً من أيّ سنة يتعدى إنتاج المصنع 10,17 مليون طن في السنة .

### التمرين الثاني: (04 نقاط)

- نعتبر المتتالية الهندسية  $(v_n)$  ذات الأساس  $e^2$  والحد الأول  $v_0 = 1$  حيث  $v_0 = 1$  (أساس اللوغاريتم النيبييري)
- (1) احسب بدلالة  $n$  المجموع  $S_n$  حيث  $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$
  - (2) نعتبر المتتاليتين  $(u_n)$  و  $(w_n)$  المعرفتين كما يلي:  
من أجل كل عدد طبيعي  $n$  ،  $w_n = 2n + 4 + e^{2n}$  ، و  $u_n = w_n - v_n$
  - (3) أثبت أنّ: من أجل كل عدد طبيعي  $n$  ،  $4 + 6 + 8 + \dots + (2n + 4) = (n + 1)(n + 4)$  ،
  - (4) استنتج المجموع  $T_n$  بدلالة  $n$  حيث  $T_n = w_0 + w_1 + \dots + w_n$

### التمرين الثالث: (04 نقاط)

في كل حالة من الحالات الآتية ، اقترحت ثلاث إجابات واحدة منها فقط صحيحة، عيّن الاقتراح الصحيح مع التبرير .

(1)  $A$  و  $B$  حادثتان مستقلتان .

إذا كان :  $P(A \cap B) = 0,03$  و  $P(A) = 0,4$  فإنّ :

(أ)  $P(B) = 0,43$  (ب)  $P(B) = 0,075$  (ج)  $P(B) = 0,37$



(2)  $A$  و  $B$  حادثتان.

إذا كان :  $P(A \cap B) = \frac{3}{100}$  و  $P_A(B) = \frac{1}{4}$  فإن :

(أ)  $P(A) = \frac{3}{25}$  (ب)  $P(A) = \frac{4}{25}$  (ج)  $P(A) = \frac{3}{400}$

(3)  $A$  و  $B$  حادثتان .

إذا كان :  $P(A) = 0,4$  و  $P(B) = 0,5$  و  $P(\overline{A \cup B}) = 0,55$  فإن :

(أ)  $P(A \cap B) = 0,2$  (ب)  $P(A \cap B) = 0,45$  (ج)  $P(A \cap B) = 0,9$

(4) الجدول التالي يُعرّف قانون احتمال تجرية عشوائية.

$x_i$	-2	-1	$\alpha$	3
$P(X = x_i)$	0,12	0,50	$\beta$	0,30

قيمتا  $\alpha$  و  $\beta$  حتى يكون الأمل الرياضي للمتغير العشوائي  $X$  يساوي 0,32 هما :

(أ)  $\alpha = 1$  و  $\beta = 0,08$  (ب)  $\alpha = 2$  و  $\beta = 0,03$  (ج)  $\alpha = 2$  و  $\beta = 0,08$

التمرين الرابع: (08 نقاط)

(I) نعتبر الدالة  $g$  المعرفة على  $\mathbb{R}$  كما يلي:  $g(x) = x^3 - x^2 - 1$ .

(1) احسب  $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$  و  $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$ .

(2) ادرس اتجاه تغير الدالة  $g$  ثم شكّل جدول تغيراتها.

(3) بين أن المعادلة  $g(x) = 0$  تقبل حلا وحيدا  $\alpha$  حيث  $1,46 < \alpha < 1,48$ .

(4) استنتج إشارة  $g(x)$  حسب قيم  $x$ .

(II) مؤسسة صناعية تنتج يوميا كمية  $q$  (مقدرة بالطن) من منتج بكلفة متوسطة  $C_M$  (مقدرة بملايين الدنانير)

معرفة على  $[0;10]$  ب:  $C_M(q) = \frac{1}{2}q^2 - q + 1 - \frac{1}{2}\ln(q^2 + 1)$ .

(1) بين أن: من أجل كل عدد حقيقي  $q$  من  $[0;10]$  ،  $C'_M(q) = \frac{g(q)}{q^2 + 1}$ .

(2) عين اتجاه تغير الكلفة المتوسطة  $C_M$  ثم شكّل جدول تغيراتها. (نأخذ  $\alpha \approx 1,47$ )

(3) عين الكمية التي تُنتج يوميا بأقل كلفة متوسطة ثم حدّد هذه الكلفة المتوسطة .

(4) ما هي الكلفة الإجمالية  $C$  لإنتاج 2 طن يوميا؟

العلامة		عناصر الإجابة
مجزأة	مجزأة	


الموضوع الأول


التمرين الأول: (04 نقاط)

01.50	0.25 0.25	<p>(1) أ) لما <math>n=0</math> ؛ <math>u_0 = -2</math> و <math>u_0 &lt; 2</math> فالخاصية صحيحة من أجل <math>n=0</math></p> <p>نفرض <math>u_n &lt; 2</math> ومنه <math>\frac{1}{2}u_n + 1 &lt; 2</math> أي <math>u_{n+1} &lt; 2</math></p> <p>وعليه من أجل كل <math>n \in \mathbb{N}</math> : <math>u_n &lt; 2</math></p>
	0.25	
	0.50	
02.00	0.50	<p>(2) أ) أثبت أن المتتالية <math>(v_n)</math> هندسية <math>v_{n+1} = \frac{1}{2}v_n</math></p> <p>أساسها <math>q = \frac{1}{2}</math></p> <p>حدها الأول <math>v_0 = -8</math></p>
	0.25	
	0.25	
00.50	0.50	<p>ب) عبارة <math>v_n</math> بدلالة <math>n</math> : <math>v_n = -8 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n</math></p> <p>استنتاج عبارة <math>u_n</math> بدلالة <math>n</math> : <math>u_n = -4 \left(\frac{1}{2}\right)^n + 2</math></p>
	0.50	
00.50	0.50	<p>(3) المجموع <math>S_n</math> : <math>S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n = 8 \left(\frac{1}{2}\right)^n + 2n - 6</math></p>

التمرين الثاني : (04 نقاط)

01.50	0.50	<p>(1) نقل واكمل الشجرة</p>	
			0.50
			0.50
		<p><math>p_{A \cap B} = p_A \times p_{A B} = 0,1575</math></p> <p><math>p_{A \cap \bar{B}} = p_A \times p_{A \bar{B}} = 0,1925</math></p>	

العلامة		عناصر الإجابة
مجزأة	مجزأة	
02.50	0.50 0.50	(2) أ) حساب الاحتمالات $P(B) = P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B) = 0,515$
	0.25 0.50	$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{63}{206}$ <p>لدينا <math>P(\bar{B}) = P(A \cap \bar{B}) + P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - P(B) = 0,485</math></p> $P_{\bar{B}}(A) = \frac{P(A \cap \bar{B})}{P(\bar{B})} = \frac{77}{194}$ <p>ومنه يكون لدينا</p>
	0.75	ب) انقل وأكمل الشجرة المقابلة . 
التمرين الثالث: (04 نقاط)		
02.00	01.00	1) أ) احسب إحداثيي النقطة المتوسطة G .
	01.00	ب) مثل سحابة النقط $M_i(x_i; y_i)$
01.00	01.00	2) بين أن معادلة مستقيم الانحدار بالمربعات الدنيا هي : $y = -4,53x + 65,54$ .
0.50	0.50	3) باستعمال التّعديل الخطّي السابق ، قدر نسبة الأمية في سنة 2038 في هذا البلد.
0.50	0.50	4) ابتداءً من أيّ سنة تكون نسبة الأمية في هذا البلد أقل من 5% .
التمرين الرابع: (08 نقاط)		
01.75	0.25 0.50 0.25	I) 1) ادرس اتجاه تغيّر الدالة g . $g'(x) = 2 - e^{2x}$ <p>إشارة <math>g'(x)</math></p> <p>g متناقصة تماماً على <math>[0; +\infty[</math> ومتزايدة تماماً على <math>]-\infty; 0]</math></p>
	0.75	2) استنتج إشارة $g(x)$ .
01.00	2x0.50	II) 1) احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ .

العلامة		عناصر الإجابة								
مجزأة	مجزأة									
01.25	0.50 0.50	$f'(x) = 2x - 1 - e^{2x} = g(x)$ (2) $f'(x) < 0$ جدول التغيرات								
	0.25	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td><math>x</math></td> <td><math>-\infty</math></td> <td><math>+\infty</math></td> </tr> <tr> <td><math>f'(x)</math></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td><math>f(x)</math></td> <td><math>+\infty</math></td> <td><math>-\infty</math></td> </tr> </table>	$x$	$-\infty$	$+\infty$	$f'(x)$	-		$f(x)$	$+\infty$
$x$	$-\infty$	$+\infty$								
$f'(x)$	-									
$f(x)$	$+\infty$	$-\infty$								
01.50	0.50	(3) أ) تبين أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا $\alpha$ حيث $-0,25 < \alpha < -0,24$								
	0.50	ب) إثبات أن المنحنى $(C_f)$ يقبل نقطة انعطاف $A$ إحداثياتها $(0; \frac{-1}{2})$ .								
	0.50	ج) كتابة معادلة المماس $(T)$ للمنحنى $(C_f)$ في النقطة $A$ $T: y = -2x - \frac{1}{2}$								
00.75	0.25	(4) رسم $(T)$								
	0.50									
01.75	01	(5) رسم المنحنى $(C_f)$								
	0.75	(6) أ) المساحة $A(\alpha)$ ب) التحقق أن: $A(\alpha) = \frac{1}{3}(4\alpha^3 - 12\alpha^2 + 6\alpha + 3) \text{ cm}^2$ .								

العلامة		عناصر الإجابة
مجزأة	مجزأة	
<b>الموضوع الثاني</b>		
<b>التمرين الأول: (04 نقاط)</b>		
01.50	01.00 0.50	(1) إحدائي النقطة المتوسطة $G(3;5,7)$ تمثيل سحابة النقط $M_i(x_i; y_i)$ في معلم متعامد
01.00	0.50 0.50	(2) $a = 0,56$ $b = 5.7 - 0.56(3) = 4.02$
0.75	0.25 0.50	(3) الهدف محقق مع التبرير : رتبة 2017 هي 8 ومنه $y = 0.56 \times 8 + 4.02 = 8.5$
0.75	0.25 0.50	(4) $0.56x + 4.02 > 10.17$ ومنه $x > 10.98$ وبتالي $x = 11$ إذن السنة هي 2020
<b>التمرين الثاني: (04 نقاط)</b>		
00.75	0.75	(1) $S_n = \frac{e^{2(n+1)} - 1}{e^2 - 1}$
01.50	0.50 2×0.50	-1 لدينا $w_n = u_n + v_n$ و $v_n = e^{2n}$ ومنه $u_n = 2n + 4$ $(u_n)$ متتالية حسابية أساسها 2 وحدها الأول $u_0 = 4$
00.75	0.75	(2) اثبات أن: من أجل كل عدد طبيعي $n$ ، $4 + 6 + 8 + \dots + (2n + 4) = (n + 1)(n + 4)$ ، يمكن اعتبار المجموع كمجموع $n$ حدا متتابعا لمتتالية حسابية حدها الأول 4 وأساسها 2 او بالبرهان بالتراجع .
01.00	01.00	(3) $T_n = (n + 1)(n + 4) + \frac{e^{2(n+1)} - 1}{e^2 - 1}$
<b>التمرين الثالث: (04 نقاط)</b>		
00.50	0.25 0.25	(1) الإجابة الصحيحة هي (ب) $p(B) = 0.075$ التعليل: $p(B) = \frac{p(A \cap B)}{p(A)} = \frac{0.03}{0.4} = 0.075$
01.00	0.25 0.75	(2) الإجابة الصحيحة هي (أ) $p(A) = \frac{3}{25}$ التعليل: $p(A) = \frac{p(A \cap B)}{p_A(B)} = \frac{\frac{3}{100}}{\frac{1}{4}} = \frac{3}{25} = 0.12$
01.00	0.25 0.75	(3) الإجابة الصحيحة هي (ب) $p(A \cap B) = 0.45$ التعليل: $p(A \cap B) = p(A) + p(B) + p(\overline{A \cup B}) - 1 = 0.4 + 0.5 + 0.55 - 1 = 0.45$



العلامة		عناصر الإجابة															
مجزأة	مجزأة																
01.50	0.50 0.50 0.50	<p>(4) الإجابة الصحيحة هي (ج) <math>p(X \geq 2) = 0.38</math>                      التعليل: <math>0.12 + 0.50 + \beta + 0.30 = 1</math> ومنه <math>\beta = 0.08</math>  <math>E(x) = -2 \times 0.12 - 1 \times 0.50 + \alpha \times 0.08 + 3 \times 0.30 = 0.16 + 0.08\alpha</math>  <math>0.16 + 0.08\alpha = 0.32</math> ومنه <math>\alpha = 2</math></p>															
التمرين الرابع: (08 نقاط)																	
00.50	0.50	(I) حساب $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty$															
01.50	0.50 0.25 0.25 0.50	<p>(2) <math>g'(x) = 3x^2 - 2x = x(3x - 2)</math>                      اشارة <math>g'(x)</math>  <math>g</math> متزايدة تماما على المجالين <math>]-\infty; 0]</math> و <math>[\frac{2}{3}; +\infty[</math> ومتناقصة تماما على <math>]0; \frac{2}{3}]</math>                      جدول التغيرات:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td><math>x</math></td> <td><math>-\infty</math></td> <td><math>0</math></td> <td><math>\frac{2}{3}</math></td> <td><math>+\infty</math></td> </tr> <tr> <td><math>g'(x)</math></td> <td><math>+</math></td> <td><math>0</math></td> <td><math>-</math></td> <td><math>0</math></td> </tr> <tr> <td><math>g(x)</math></td> <td><math>-\infty</math></td> <td><math>-1</math></td> <td><math>-\frac{31}{27}</math></td> <td><math>+\infty</math></td> </tr> </table>	$x$	$-\infty$	$0$	$\frac{2}{3}$	$+\infty$	$g'(x)$	$+$	$0$	$-$	$0$	$g(x)$	$-\infty$	$-1$	$-\frac{31}{27}$	$+\infty$
$x$	$-\infty$	$0$	$\frac{2}{3}$	$+\infty$													
$g'(x)$	$+$	$0$	$-$	$0$													
$g(x)$	$-\infty$	$-1$	$-\frac{31}{27}$	$+\infty$													
00.50	0.50	(3) تبين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا $\alpha$ حيث $1.46 < \alpha < 1.48$ .															
00.50	0.50	(4) استنتج إشارة $g(x)$ حسب قيم $x$ . $g(x) < 0$ من اجل $x \in ]-\infty; \alpha[$ و $g(x) > 0$ من اجل $x \in ]\alpha; +\infty[$ و $g(\alpha) = 0$															
01.00	01.00	(I) من أجل كل $q$ من $]0; +\infty[$ : $C'_M(q) = \frac{q^3 - q^2 - 1}{q^2 + 1}$															
02.00	01.00 01.00	<p>(2) إشارة <math>C'_M(q)</math> من إشارة <math>g(q)</math> منه <math>q = \alpha</math>  <math>C_M</math> متناقصة تماما على <math>]q; +\infty[</math> و متزايدة تماما على <math>]q; -\infty[</math>.                      جدول التغيرات:</p>															
01.00	01.00	(3) عدد الوحدات هو: $q = \alpha \times 100 = 147$ وحدة بكلفة															
01.00	01.00	(4) الكلفة الإجمالية $C$ لإنتاج 2 طن هي $390000DA$															